


	<p><b>OHVIRA</b> (Obstructed Hemivagina, Ipsilateral Renal Anomaly)</p> <p><b>Порок развития половой и мочевыделительной системы: Удвоение матки и влагалища с частичной аплазией одного влагалища. Отсутствие почки со стороны частично аплазированного влагалища.</b></p>
<p><b>Что это за порок развития?</b> (см. рисунок)</p> <p>Это неправильное развитие «Мюллеровых протоков», которые являются основой развития женской репродуктивной системы (матки, маточных труб, шейки матки и части влагалища) во время внутриутробного развития девочки.</p> <p>У женщин с описываемым пороком развития есть две матки, обе матки функционируют и в периоде полового развития в них бывает менструация. Менструальная кровь из одной матки, как обычно, выделяется из влагалища наружу, а второе влагалище сформировано так, что не позволяет крови выделяться, влагалище заблокировано – обструкция. Менструальная кровь скапливается в верхней свободной части второго влагалища и от этого возникают боли в дни менструации.</p> <p>Вторая часть особенности развития таких девушек заключается в том, что вместо двух почек, как у большинства людей, у них только одна почка. Такая особенность мочевыделительной системы, так же закладывается внутриутробно. При таком пороке развития почка отсутствует именно с той стороны, с которой неправильно сформировалось влагалище. Не следует думать, что у всех девочек с одной почкой обязательно будет такое развитие матки и влагалища, но при описанном пороке развития матки и влагалища всегда будет одна почка.</p>	<p>Pediatric and Adolescent Gynecology, 6th ed, Emans SJ, Laufer MR (Eds), Lippincott Williams &amp; Wilkins, Philadelphia 2012. Copyright © 2012 Lippincott</p>  <p><b>Почему бывает такое состояние?</b></p> <p>Это врожденная аномалия, и значит, что еще до рождения ребенка ситуация сформировалась, но не проявлялась до периода полового созревания.</p>
<p><b>Какие симптомы бывают при таком пороке?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● сильная боль во время менструации</li> <li>● частые или постоянные боли внизу живота</li> </ul> <p>Практически с первой менструации</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● образование в полости таза</li> </ul>	<p><b>Поддается ли лечению такая ситуация?</b></p> <p>Да! Вас направят к гинекологу, которому понадобится сделать операцию, чтобы разблокировать выход менструальной крови из второй матки и позволить ей вытекать свободно. Большинство девушек чувствуют себя лучше очень быстро после операции, хотя вам может</p>

<ul style="list-style-type: none"><li>● боль во влагалище (глубоко внутри таза)</li></ul>	потребуется немного болеутоляющего лекарства на несколько дней. Некоторые девочки также принимают лекарства для контроля менструального периода. Ваш доктор обсудит с вами, если ли необходимость для использования гормональной терапии, и какая терапия будет лучшей.
---	--

**Может ли заболевание повлиять на мое будущее?**

Поговорите со своим врачом о том, как ваша особенность развития матки, влагалища и почки может повлиять на вашу жизнь и возможность иметь детей в будущем. Многие женщины с аномалиями развития матки или влагалища, и такими как у тебя могут иметь беременность, если они хотят иметь детей.