

	Urethral Prolapse Пролапс (выпадение) уретры
<p>Что такое пролапс уретры? Уретра - это трубка, через которую проходит моча, когда он покидает мочевого пузыря. Выпадение уретры (пролапс) происходит, когда внутренняя часть мочеиспускательного канала видна из отверстия уретры. Это происходит чаще у младших девочек с запором или с хроническим кашлем.</p>	
<p>Каковы симптомы бывают при выпадении уретры ? У девочек может быть кровотечение, боль, болезненное мочеиспускание и трудности с мочеиспусканием. Иногда на их нижнем белье видна кровь. Часто пациенты не испытывают симптомы.</p>	<p>После лечения может ли уретральный пролапс повториться? Будет ли это причиной проблемы позже в жизни?</p> <p>Выпадение уретры повторяется не часто. Для того, чтобы снизить вероятность рецидива, девочки не должны иметь симптомов запора, а так же необходимо вылечить кашель.</p>
<p>Как будет мой врач диагностировать уретральный пролапс? Это диагностируется при осмотре. Врач видит выпавшую часть уретры, которая напоминает выпячивание ткани на отверстии уретры или ее открытие.</p>	
<p>Как лечится уретральный пролапс? Выпадение мочеиспускательного канала лечится кремом с эстрогеном два раза в день, а также используют сидячие ванночки с теплой водой. Исследование на инфекции мочевыводящих путей важно, если у пациентов есть жжение при мочеиспускании . Если пролапс не отвечает на лечение кремом эстрогеном, может быть необходимой операция.</p>	

Выпадение = prolapse